



ကြံသီးနှံအထွက်တိုးစေရန်သတိပြုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်အချက်များ



- ၁။ လမိုင်းပြုပြင်ရန်အထွက်ပိုးများ၊ ရောဂါကင်းစင်သော၊ အထွက်ကောင်းမျိုးစိုက်ပိုးထားသည့် ခင်းသစ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ တစ်ပတ် ထက်မကျော်လွန်ဘဲ အပြီးခုတ်သိမ်းပါ။
- ၂။ ခုတ်သိမ်းရာတွင်အခြေကျကျခုတ်သိမ်းပြီးပေါက်ပြားထက်ထက်ဖြင့် မြေအောက်၍လက်မခန့်နိုက်ပြီးငုတ်ဖြတ်ပေးပါ။
- ၃။ လမိုင်းပြုပြင်ရာတွင်ထွန်စက်ဖြင့်ထွန်(၂)စပ်၊ ၅ကြမ်း(၁)စပ်ဝင် ပါ (သို့မဟုတ်) နွားထယ်ဖြင့် ဘယ်ညာတစ်ဖက်စီ အသွားအပြန် ဆောင်ဖြို့ပေးပါ။
- ၄။ ငုတ်ဖြတ်ဆောင်ဖြို့သွင်းရေပေးသွင်းပြီး မြေအောင်းပိုးသတ်ဆေးသောဝမြေဉာဏ်နှင့် ပါတ်မြေဉာဏ်များအချိုးကျ ထည့်သွင်းပေးပါ။
- ၅။ ပေါင်းကာကွယ်ရန်၊ အစိုးရောက်ထိန်းရန်၊ မြေဆွေးရရှိရန် အထွက် ကြံရွက်ခြောက်များကိုပင်ကြား၊ တန်းကြားအထွင်း ညီညာစွာ ဖြန့်ခေါ်ပေးပါ။
- ၆။ လမိုင်းပြုပြင်ပြီး(၁)လခန့်အကြာ ပင်သေပင်ပျောက်နေရာများတွင် အပင်ဖော်စိုက်ပိုးပါ။ ပေါင်းမြေကိုနှစ်နှင့်ခြင်းအား (၄)လ အထွင်းဆောင်ရွက်ပါ။
- ၇။ အပင်သက်တမ်း (၉၀-၁၂၀)ရက်အထွင်း အစိုးရောက်လုံလောက်အောင် ရေပေးသွင်း၍ ပါတ်မြေဉာဏ်ကို(၂-၃)ကြိမ်ခွဲထည့်ပြီး ဆောင်လုံး ပေးပါ။ မိုးဦးကျကာလတွင် ဆောင်ကြီးလုံးခြင်းကိုမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ပေးပါ။
- ၈။ လမိုင်းခင်းတွင် ကြံမှုနှံရောဂါကျရောက်တတ်သဖြင့် ရောဂါကျကြံမှုရောင်းပါကြိုတစ်ပင်လုံး တူးထုတ်မီးရှိပစ်ပါ။ ကြိုပင်ထိုးပိုးများကျရောက်ပါက ဒိုင်မီသို့ရိုတ်ဆေးရည်ဟင်းစားဇွန်း(၃-၅)နွှန်းကိုရောင့်(၄) ဂါလံနှုန်းဖျော်ပြီး(၃)ပတ်ခြား(၁)ကြိမ်ပက်ဖျော်းပါ။
- ၉။ အလေအလွင့်မရှိစေရန်ကြိုပင်ခြေမြေကြီးနှင့်ကပ်၍ခုတ်သိမ်းပါ။ ကောက်သင်းကောက်ခြင်းကိုမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ပါ။
- ၁၀။ ကြံလမိုင်းစနစ်တကျပြုပြင်ပြီးအပင်ပြုစုမှုကောင်းပါ ကလမိုင်းသည်ခင်းသစ်အတိုင်းအထွက်နှုန်းကောင်းနိုင်ပါသည်။